استطبابات استخدام الديوبيرافين من قبل أطباء جراحة الأوعية

بعد التقصي عن استطباب الديوبيرافين لدى أطباء جراحة الأوعية ضمن المؤتمر المخصص لهم في بداية شهر آب ومن خلال الندوة العلمية لشركة ابن الهيثم، انحصر استطباب الديوبيرافين في الحالات التالية:

- **تضييق الشريان السباتي Carotid stenosis :**

يستخدم الديوبيرافين لدى مرضى تضييق الشريان السباتي العرضيين واللاعرضيين في حال تم اجراء قثطرة لديهم ويجب ان تستمر المعالجة بهذه المشاركة على الأقل لمدة شهر.

- **اعتلال الشرايين المحيطية Peripheral Artery Disease (PAD):**

إن المعالجة الأساسية لمرضى اعتلال الشرايين المحيطية باستخدام المميعات هي:

الريفاروكسابان (ديكاليرتو) بجرعة 2.5 ملغ مرتين يومياً مع الأسبرين (80-100 ملغ) مرة يومياً، ولكن يمكن أن يستخدم الديوبيرافين في الحالات التالية:

- مرضى **PAD** الذين يعانون من أعراض واضحة في الأطراف السفلية ولديهم خطورة نزفية منخفضة، في حال كان الريفاروكسابان مضاد استطباب لديهم.
- ينصح بإضافة الديوبيرافين للمعالجة لدى مرضى **PAD** بعد اجراء اعادة توعية في الأطراف السفلية لديهم، أي أنه في هذه الحالة من الممكن مشاركة الديوبيرافين مع ديكاليرتو 2.5 ملغ (بدلا من استخدام ريفاروكسابان – اسبرين لوحده- كلوبيدوغريل لوحدة) لدى هؤلاء المرضى لمدة شهر.

Ibn Al Haytham
Pharma. Co.

Dr. Majd Haidar
Product Manager

Contacts:
Damascus: +963 (11) 4434582
Mobile: +963 947461992
E-mail: majd.haidar@ibn-alhaytham.com
Website: www.ibn-alhaytham.com